

Филиал ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» по Ставропольскому краю
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 25

**Адрес: 355021, Ставропольский край, город Ставрополь,
3-й Юго-Западный проезд, 12-А
Тел. (865-2) 77-98-42, 77-61-28**



Информационный листок №25
Мышевидные грызуны

Мышевидные грызуны являются многоядными вредителями, которые способны нанести значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Мониторинг численности мышевидных грызунов должен быть постоянным!

Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю проведено обследование на выявление мышевидных грызунов на общей площади более 880 тыс. га, заселено более 670 тыс. га (в 2025 г. заселено 261 тыс. га) со средней численностью 14 жил. нор/га, максимальная численность 80 жил. нор/га на площади 0,02 тыс. га в Апанасенковском районе. Повышенная численность вредителя зафиксирована в 17 районах края.

Напоминаем, для снижения численности мышевидных грызунов рекомендуем проводить:

- мониторинг мест резерваций (лесополосы, пастбища, обочины дорог, участки, занятые луговой и степной растительностью).
 - соблюдение севооборота;
 - уничтожение послеуборочных остатков и сорной растительности вокруг полей и обработка почвы на обочинах и межах полей;
 - борьба с сорняками, особенно с крупнотелельными, на целинных землях, в постоянных очагах размножения (лишает грызунов укрытия от птиц и хищников);
 - глубокая вспашка (пахота разрушает норы, выворачивает гнезда, гибнет весь неполовозрелый молодняк, гибнет более половины молодняка в возрасте 12—15 дней и взрослые полевки, уничтожает кормовую базу для полевок);
 - пахоту начинать с края полей, от лесополос к середине поля, опашка полей по периметру для защиты от перехода мышевидных грызунов из лесополос;
- при высокой численности применение химических родентицидов (особенно по технологии обработки почвы No-till).

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» готовы оказать поддержку сельхозтоваропроизводителям при проведении мониторинга.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю производит приманку от мышевидных грызунов на основе химического родентицида (д.в. Бродифакум) и распаренного (автоклавированного) зерна. Так как основу приманки составляет зерно, которое так любят мышевидные грызуны и следуя на запах они начинают поедать зерновую приманку, содержащую активное действующее вещество. Отравляющий эффект проявляется через 3-7 дней. Отличная поедаемость – 100 % результат. Приманка на основе автоклавированного зерна имеет значительно более высокую пищевую привлекательность для мышевидных грызунов, чем приманка, приготовленная обычным способом полусухого протравливания. Исключено прораствание зерна в поле - так как при пропаривании происходит стерилизация, что подавляет естественные биологические процессы, происходящие в зерне. Это снижает риск порчи зерна, например, из-за плесени и болезнетворных бактерий.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Особое внимание обратить на способ внесения приманок и готовых препаратов, приготовленных на основе химических родентицидов – только ручное внесение в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными ампликаторами. Исключить поедание человеком, животными и птицами.

По вопросам приобретения и для получения дополнительной информации обращаться в районные отделы ФГБУ «Россельхозцентра», а также по тел. (8655) 32-30-26, (8652) 77-98-42.

По вопросам приобретения бюджетных препаратов обращаться в районные отделы ФГБУ «Россельхозцентра», а также по тел. (8655) 32-30-26, (8652) 77-98-42.

25.09.2026 г.

**Информационный канал
«Россельхозцентр Ставропольский край»
Присоединяйтесь!**

