

СИГНАЛ № 22.

Внимание, мышевидные грызуны!



По результатам фитосанитарного мониторинга отмечается повышенное распространение мышевидных грызунов, в первую очередь на полях после уборки озимых зерновых культур. На сегодняшний день летние обследования по мышевидным грызунам проведены на общей площади 435,5 тыс. га, заселение выявлено на площади 322,1 тыс. га со средней численностью 9,1 жил. нор/га, максимальная численность 50 жил. нор/га на площади 0,7 тыс. га в Ипатовском районе (что в 3 раза выше аналогичного периода прошлого года). Повышенная численность вредителя зафиксирована на

стерне в 7 районах края: Апанасенковском, Ипатовском, Новоселицком, Советском, Туркменском, Георгиевском, Кировском.

Мышевидные грызуны – относятся к особо опасным вредителям, требующим повышенного внимания со стороны специалистов «Россельхозцентра» и агрономической службы сельхозтоваропроизводителей.

Для снижения численности мышевидных грызунов (до посева зерновых культур) рекомендуем кроме родентицидных обработок проводить агротехнические мероприятия в станциях резерваций:

- Постоянный мониторинг мест резерваций (лесополосы, пастбища, обочины дорог, участки, занятые луговой и степной растительностью);
- соблюдение севооборота;
- лущение стерни с последующей вспашкой;
- уничтожение послеуборочных остатков и сорной растительности вокруг полей и обработка почвы на обочинах и межах полей;
- своевременная и без потерь уборка урожая с обязательным удалением или заделкой соломы;
- борьба с сорняками, особенно с крупностебельными, на целинных землях, в постоянных очагах размножения (лишает грызунов укрытия от птиц и хищников);
- глубокая вспашка (пахота разрушает норы, выворачивает гнезда, гибнет весь неполовозрелый молодняк, гибнет более половины молодняка в возрасте 12—15 дней и взрослые полевки, уничтожает кормовую базу для полевок, служит надёжным истребительным мероприятием против мышевидных грызунов);
- пахоту начинать с края полей, от лесополос к середине поля;

- опашка полей по периметру для защиты от перехода мышевидных грызунов из лесополос.

Все эти мероприятия препятствуют распространению мышевидных грызунов, лишают их мест резервации.

22.08.2026 г.

**Информационный канал
«Россельхозцентр Ставропольский край»
Присоединяйтесь!**

